

绵阳市高中 2021 级第一次诊断性考试

理科数学参考答案及评分意见

一、选择题：本大题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分.

BCDAC ADBBD CC

二、填空题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分.

13. 7

14. $2\sqrt{2}$

15. 9

16. -1

三、解答题：本大题共 6 小题，共 70 分.

17. 解：(1) 由 a_1, a_2, a_4 成等比数列，则 $a_2^2 = a_1 \cdot a_4$ ，..... 2 分

$$\therefore (a_1 + 2)^2 = a_1 \cdot (a_1 + 6),$$

可解得 $a_1 = 2$ ，..... 3 分

$$\therefore \text{数列 } \{a_n\} \text{ 的前 } n \text{ 项和 } S_n = n \cdot a_1 + \frac{n \cdot (n-1)}{2} \cdot d = n^2 + n; \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$(2) \quad b_n + b_{n+1} = (\sqrt{2})^{a_n} = (\sqrt{2})^{2n} = 2^n \quad \text{①}, \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

当 $n=1$ 时， $b_1 + b_2 = 2$ ，可得 $b_2 = 1$ ，..... 7 分

$$\text{可得 } b_{n+1} + b_{n+2} = 2^{n+1} \text{ ②}, \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$\text{由②式}-\text{①式，得 } b_{n+2} - b_n = 2^{n+1} - 2^n = 2^n, \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

$$\therefore b_{2n} = (b_{2n} - b_{2n-2}) + (b_{2n-2} - b_{2n-4}) + \dots + (b_4 - b_2) + b_2$$

$$= 2^{2n-2} + 2^{2n-4} + \dots + 2^2 + 1 \quad \dots\dots\dots 11 \text{ 分}$$

$$= \frac{4(1-4^{n-1})}{1-4} + 1$$

$$= \frac{4^n - 1}{3}. \quad \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

18. 解：(1) $\because T = \frac{\pi}{\omega} = \frac{8\pi}{3}$ ，则 $\omega = \frac{3}{8}$ ，..... 1 分

$$\text{又 } f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{8} + \varphi\right) = 1, |\varphi| < \frac{\pi}{2}, \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \varphi = \frac{\pi}{8}, \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\therefore f(x) = \tan\left(\frac{3}{8}x + \frac{\pi}{8}\right); \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 由题意, } g(x) = \tan\left(\frac{3}{8}x + \frac{3}{8}\lambda + \frac{\pi}{8}\right), \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$\because -f(0) = -\tan\frac{\pi}{8} = \tan\left(-\frac{\pi}{8}\right) \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$\therefore \text{由 } g\left(\frac{\pi}{4}\right) = -f(0), \text{ 得 } \tan\left(\frac{3\pi}{32} + \frac{3}{8}\lambda + \frac{\pi}{8}\right) = \tan\left(-\frac{\pi}{8}\right) \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$\therefore \frac{3}{8}\lambda + \frac{7\pi}{32} = -\frac{\pi}{8} + k\pi, \quad k \in \mathbf{Z}, \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

$$\therefore \lambda = -\frac{11}{12}\pi + \frac{8k\pi}{3}, \quad k \in \mathbf{Z}, \text{ 又 } \lambda > 0, \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

$$\therefore \lambda \text{ 的最小值为 } \frac{7\pi}{4}. \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

19. 解: (1) $\because f(x) = (2x^2 + m)(x - m + 2) = 2x^3 - 2(m-2)x^2 + mx - m(m-2)$ 为奇函数,

$$\therefore \begin{cases} -2(m-2) = 0 \\ -m(m-2) = 0 \end{cases}, \text{ 解得: } m=2. \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

(2) 当 $m > 0$ 时, $2x^2 + m > 0$,

$\therefore$ 函数 $f(x) = (2x^2 + m)(x - m + 2)$ 不可能有两个零点. $\dots\dots\dots 6 \text{ 分}$

当 $m < 0$ 时, 由 $f(x) = 0$, 解得: $x = \pm\sqrt{-\frac{m}{2}}$ 或 $m-2$, $\dots\dots\dots 7 \text{ 分}$

要使得 $f(x)$ 仅有两个零点, 则 $m-2 = -\sqrt{-\frac{m}{2}}$, $\dots\dots\dots 8 \text{ 分}$

即 $2m^2 - 7m + 8 = 0$, 此方程无解.

故 $m=0$, 即 $f(x) = 2x^3 + 4x^2$, $\dots\dots\dots 9 \text{ 分}$

令 $h(x) = f(x) - 3 = 2x^3 + 4x^2 - 3$, 则 $h'(x) = 6x^2 + 8x = 2x(3x + 4)$,

$h'(x) > 0$, 解得: $x > 0$ 或 $x < -\frac{4}{3}$, $h'(x) < 0$ 解得: $-\frac{4}{3} < x < 0$,

故 $h(x)$ 在 $(-\infty, -\frac{4}{3})$, $(0, +\infty)$ 上递增, 在 $(-\frac{4}{3}, 0)$ 上递减, $\dots\dots\dots 10 \text{ 分}$

又 $h(-\frac{4}{3}) = -\frac{17}{27} < 0$,

故函数 $y = f(x) - 3$ 仅有一个零点. 12 分

20. 解: (1) $\because \cos(C-B)\sin A = \cos(C-A)\sin B$

$$\therefore (\cos C \cos B + \sin C \sin B) \sin A = (\cos C \cos A + \sin C \sin A) \sin B \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \cos C \cos B \sin A = \cos C \cos A \sin B \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

又 $\because \triangle ABC$ 为斜三角形, 则 $\cos C \neq 0$,

$$\therefore \cos B \sin A = \cos A \sin B, \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$\therefore \sin(A-B) = 0$, 又 A, B 为 $\triangle ABC$ 的内角,

$$\therefore A = B; \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

(2) 由 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{a}{2}$,

$$\therefore S = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{a}{2}, \text{ 则 } b \sin C = 1, \text{ 即 } \frac{1}{b} = \sin C, \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$\text{由 } S = \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{a}{2}, \text{ 则 } c \sin B = 1, \text{ 即 } \frac{1}{c} = \sin B, \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

由 (1) 知 $A = B$ 则 $a = b$,

$$\therefore \frac{1}{c^2} - \frac{1}{a^2} = \sin^2 B - \sin^2 C, \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

又 $\sin C = \sin(A+B) = \sin 2B$,

$$\therefore \frac{1}{c^2} - \frac{1}{a^2} = \sin^2 B - \sin^2 2B = \sin^2 B - 4 \cos^2 B \sin^2 B = \sin^2 B - 4(1 - \sin^2 B) \sin^2 B \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

令 $\sin^2 B = t$, 令 $f(t) = t - 4(1-t)t = 4t^2 - 3t$,

又因为 $0 < \sin^2 B < 1$, 即 $0 < t < 1$,

$$\therefore \text{当 } t = \frac{3}{8} \text{ 时, } f(t) \text{ 取最小值, 且 } f(t)_{\min} = -\frac{9}{16}, \dots\dots\dots 11 \text{ 分}$$

综上所述: $\frac{1}{c^2} - \frac{1}{a^2}$ 的最小值为 $-\frac{9}{16}$ 12 分

21. 解: (1) 当 $a = 2$ 时, $f(x) = (\ln x - 2x + 2) \ln x$,

$$f'(x) = \left(\frac{1}{x} - 2\right) \ln x + \frac{\ln x - 2x + 2}{x} = \frac{-2(x-1)(\ln x + 1)}{x}, \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

令 $f'(x) > 0$ 得: $\frac{1}{e} < x < 1$; 令 $f'(x) < 0$ 得: $0 < x < \frac{1}{e}$ 或 $x > 1$, 3 分

$\therefore f(x)$ 的单调递减区间为: $(0, \frac{1}{e})$ 和 $(1, +\infty)$; 单调递增区间为: $(\frac{1}{e}, 1)$. $\cdots$ 5 分

(2) $f(x) \leq \frac{e^x}{x} - x^2 + ax - a$ 等价于 $e^{x-\ln x} - (x - \ln x)^2 + a(x - \ln x - 1) \geq 0$ (*) $\cdots$ 6 分

令 $t = g(x) = x - \ln x$, 则 $g'(x) = \frac{x-1}{x}$,

$\therefore g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上递减, 在 $(1, +\infty)$ 上递增。

$\therefore g(x)$ 的最小值为 $g(1) = 1$, 即: $t \geq 1$, $\cdots$ 8 分

(*) 式化为: $e^t - t^2 + a(t-1) \geq 0$, 当 $t=1$ 时, 显然成立.

当 $t > 1$ 时, $a \geq \frac{t^2 - e^t}{t-1}$, 令 $h(t) = \frac{t^2 - e^t}{t-1}$ ($t > 1$), 则 $a \geq h_{\max}(t)$, $\cdots$ 9 分

$h'(t) = \frac{-(t-2)(e^t - t)}{(t-1)^2}$, 当 $t > 1$ 时, 易知 $e^t - t > 0$,

故易得: $h(t)$ 在 $(1, 2)$ 上单调递增, 在 $(2, +\infty)$ 上单调递减, $\cdots$ 10 分

$\therefore h(t)_{\max} = h(2) = 4 - e^2$, $\cdots$ 11 分

$\therefore$ 实数 a 的取值范围为: $a \geq 4 - e^2$. $\cdots$ 12 分

22. 解: (1) 曲线 C_1 的参数方程为 $C_1: \begin{cases} x = t + \frac{1}{t} \text{ ①} \\ y = t - \frac{1}{t} \text{ ②} \end{cases}$ (t 为参数),

由 ①² - ②² 得 C_1 的普通方程为: $x^2 - y^2 = 4$; $\cdots$ 2 分

曲线 C_2 的参数方程为 $C_2: \begin{cases} x = 2 + 2\cos\alpha \\ y = 2\sin\alpha \end{cases}$ (α 为参数),

所以 C_2 的普通方程为: $(x-2)^2 + y^2 = 4$; $\cdots$ 4 分

(2) 曲线 C_1 的极坐标方程为: $\rho^2 \cos^2 \theta - \rho^2 \sin^2 \theta = 4$ ($\theta \neq \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$), $\cdots$ 5 分

$\therefore \rho^2 = \frac{4}{\cos 2\theta}$, $\cdots$ 6 分

由 $\begin{cases} \theta = \frac{\pi}{6} \\ \rho^2 = \frac{4}{\cos 2\theta} \end{cases}$ 得: $\rho_A = 2\sqrt{2}$,

∴射线: $\theta = \frac{\pi}{6} (\rho > 0)$ 与曲线 C_1 交于 $A(2\sqrt{2}, \frac{\pi}{6})$, 7 分

曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta - 4\rho \cos \theta = 0 \Rightarrow \rho = 4\cos \theta$,

$$\text{由} \begin{cases} \theta = \frac{\pi}{6}, \\ \rho = 4\cos \theta, \end{cases} \text{得: } \rho_B = 2\sqrt{3},$$

∴射线: $\theta = \frac{\pi}{6} (\rho > 0)$ 与曲线 C_2 交于 $B(2\sqrt{3}, \frac{\pi}{6})$, 9 分

则 $S_{\triangle PAB} = S_{\triangle POB} - S_{\triangle POA} = \frac{1}{2} \times |OP| \times (\rho_B - \rho_A) \sin \frac{\pi}{6} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$ 10 分

23. 解: (1) $f(x) = |3x+3| - |x-5| = \begin{cases} 2x+8, & x \geq 5, \\ 4x-2, & -1 < x < 5, \\ -2x-8, & x \leq -1, \end{cases}$ 1 分

∴ $f(x) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 5 \\ 2x+8 > 0 \end{cases} \text{或} \begin{cases} -1 < x < 5 \\ 4x-2 > 0 \end{cases} \text{或} \begin{cases} x \leq -1 \\ -2x-8 > 0 \end{cases}$, 2 分

解得 $x \geq 5$ 或 $\frac{1}{2} < x < 5$ 或 $x < -4$, 4 分

∴不等式的解集为 $(-\infty, -4) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$; 5 分

(2) 证明: 由 $f(x) = \begin{cases} 2x+8, & x \geq 5 \\ 4x-2, & -1 < x < 5 \\ -2x-8, & x \leq -1 \end{cases}$, 可得 $f(x)$ 的最小值为 -6 , 6 分

则 $m = -6$, $a+b+c=6$,

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} &= \frac{1}{12} [(a+b) + (b+c) + (c+a)] \left(\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} \right) \\ &= \frac{1}{12} \left(3 + \frac{b+c}{a+b} + \frac{c+a}{a+b} + \frac{a+b}{b+c} + \frac{c+a}{b+c} + \frac{a+b}{c+a} + \frac{b+c}{c+a} \right) \end{aligned}$$
 7 分

$$\geq \frac{1}{12} \left(3 + 2\sqrt{\frac{b+c}{a+b} \cdot \frac{a+b}{b+c}} + 2\sqrt{\frac{c+a}{a+b} \cdot \frac{a+b}{c+a}} + 2\sqrt{\frac{c+a}{b+c} \cdot \frac{b+c}{c+a}} \right)$$
 8 分

$$= \frac{1}{12} (3 + 2 + 2 + 2) = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}, \text{ 当且仅当 } a=b=c=2 \text{ 时, 等号成立,} \text{ 9 分}$$

$$\therefore \frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} \geq \frac{3}{4}. \text{ 10 分}$$